

La plupart des maladies sont dues au surpeuplement, au manque d'hygiène et à des erreurs commises dans l'alimentation : manque de matières minérales et de vitamines, manque ou excès de protéines. L'animal malade ne mange pas, il est inerte, les plumes ébouriffées, les ailes pendantes, la crête pâle ou violacée. **Il faut isoler immédiatement les malades. Dans la plupart des cas, on a intérêt à consulter un vétérinaire ou à sacrifier l'animal malade, si aucun traitement n'est efficace.**

! Les traitements ne sont donnés qu'à titre indicatif, veuillez prendre l'avis d'un vétérinaire avant toute intervention !

Maladies	Symptômes	Traitements possibles
Carence et avitaminoses	Baisse de vitalité, de production, picage	Apport de vitamines, oligo-éléments
Maladies parasitaires		
- Poux et puces	Poux blancs qui ne quittent pas l'oiseau, poux rouges et puces sucent le sang. Affaiblissement général, crête et face décolorées.	Insecticides en pulvérisations (animaux et environnement (bâtiment, perchoirs). Installation de "poudroie" où les volailles aiment se "nettoyer". (une grande caisse avec de la terre sèche et pulvérulente, de la cendre, on peut y mélanger de la poudre anti-poux et puces).
- La gale des pattes	Affection causée par un acarien qui creuse des galeries dans l'épaisseur de la peau des pattes. Soulèvement des écailles, déformation des doigts et pattes.	Un remède de "grand-mère" : application d'une solution composée de : 1/3 huile blanche (cuisine) 1/3 fleur de soufre 1/3 pétrole lampant jusqu'à disparition et chute des croûtes de gales.
- Les coccidioses	Causées par différentes espèces de coccidies (protozoaires). abattement général, plumes ébouriffées, amaigrissement, ailes tombantes, anémie, diarrhées avec des traces de sang.	Sulfamides et désinfection des bâtiments.
Les vers - intestin (ténia, ascaris, hétérakis, trichostrongles, etc). - trachée (syngamoses)	Anémie, perte d'appétit, amaigrissement.	Vermifuges et désinfection des bâtiments et surtout les sols.
Maladies infectieuses		
- Typhose et choléra	Diarrhée verdâtre ou glaireuse et sanguinolente. Prostration des animaux, plumage hérissé.	Isolation des malades, désinfection et consultation du vétérinaire.
- Tuberculose	Contagion rapide et mortalité élevée. Amaigrissement continu accompagné de diarrhée verdâtre, de boiteries, d'anémie manifestée par la pâleur de la face et de la crête.	Pas de vaccin; suppression des malades et désinfection de l'environnement.
- Variole diphtérique	Maladie très contagieuse présentant plusieurs formes : - buccale (fausses membranes jaunâtres et épaisses dans la bouche). - oculaire (inflammation de la muqueuse des yeux, gonflés et purulents). - variolique (boutons croûteux envahissant la peau, la face et la crête).	Vaccin en prévention - traitement local : on arrache les fausses membranes à l'aide d'une petite pince et on cautérise les plaies avec de la teinture d'iode glycéinée. On lave les yeux à l'eau boriquée et on enduit ensuite avec une pommade d'oxyde de zinc. On touche les boutons croûteux qui ne sont pas sur les yeux avec de la teinture d'iode glycéinée. - traitement général :Aliments riches en vitamine A.
- Coryza	Ecoulement des narines clair puis épais, inflammation des yeux. Très contagieux. Très fréquent après les changements de temps (humide/chaud).	Streptomycine en piqûre et isolement.
- M.R.C. (Maladie Respiratoire Chronique)	Affection causée par un germe (<i>mycoplasme gallisepticum</i>) du au surpeuplement, manque d'aération, déséquilibre alimentaire, stress. Respiration difficile, suffocation.	Traitement complexe et réalisé par la combinaison de trois antibiotiques.
- Peste aviaire (maladie de New Castle)	Mortalité élevée, respiration pénible, paralysie, diarrhée, crête et peau violacées.	Seule la vaccination renouvelée (obligatoire) est efficace.
- Leucoses	Groupe de maladies apparaissant sur les sujets de trois mois et plus sous forme de mortalité individuelle, surtout au moment de l'entrée en ponte. - paralysie des membres - lésions oculaires	Pas de traitement, éviter d'élever les jeunes à proximité des adultes.

- Pullorose
 - os des pattes très épais.
 - Septicémie chez le poussin, diarrhée blanche, respiration difficile, baisse de l'appétit, mort subite.
 - Antibiotiques à large spectre. Les oiseaux guéris ne doivent pas être conservés comme reproducteurs.
- Bronchite infectieuse aviaire (B.I.)
 - Maladie causée par un virus qui touche surtout les poussins après la deuxième semaine d'âge.
 - difficultés respiratoires, respiration ronflante, et toux avec cris émis le cou tendu, perte d'appétit, mortalité chez les poussins mais pas chez les adultes.
 - Seule la vaccination renouvelée est efficace.

En conclusion, les maladies sont généralement faciles à prévenir, difficiles à guérir. On les prévient en tenant propre, en nourrissant bien, en aérant suffisamment : l'air est le premier des aliments. Les animaux ne doivent jamais manquer d'eau potable et saine. L'environnement (terrain, bâtiments) doit être également sain et propre. Les animaux contaminés doivent être automatiquement écartés du reste de l'élevage afin d'éviter toutes contaminations.